

GYERMEKKORI KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT VÉDŐOLTÁSOK

	Csecsemő												Gyermek										Serdülő				
Szü- letés	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	13. hó	14. hó	15. hó	16. hó	17. hó	18. hó	24. hó	...	6. év	9. év	10. év	11. év	VI. oszt.	VII. oszt.	14. év felett

Életkorhoz kötött kötelező védőoltások

BCG ¹	■																											
DTPa + IPV + Hib ²		■	■	■														■										
DTPa + IPV ²																					■							
dTap ²																									■			
PCV13 ³		■		■								■										□	□	□	□	□	□	□
MMR ⁴										□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□
Bárányhimlő ⁵										□	□	□	□	■	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
HepatitisB ⁶	■	■				■																				■	■	
HPV ⁸ (önkéntes)																						□	□	□	□	□	■	■

Önkéntes, kiemelt támogatású, 300 Ft térítési díjú védőoltás

MenC ⁷			□	■	□	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□
-------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ajánlott, önköltséges védőoltások

	Szü- letés	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	13. hó	14. hó	15. hó	16. hó	17. hó	18. hó	24. hó	...	6. év	9. év	10. év	11. év	VI. oszt.	VII. oszt.	14. év felett
Rotavírus ⁹			■	■	■	□	□	□	□																			
MenB ⁷			■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□
Men A,C,W,Y ⁷			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□
Kullancs- encephalitis ¹⁰													□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Influenza ¹¹						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hepatitis A ¹²													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

JELMAGYARÁZAT

- kötelező védőoltások, HPV esetében kötelezően felajánlandó
- önkéntes, 300 Ft térítési díjú védőoltás
- önkéntes, 300 Ft térítési díjú védőoltás javasolt időpontban

- HepatitisB: HBsAg pozitív vagy nem vizsgált anyák újszülötteinek
- ajánlott, önköltséges védőoltások javasolt időpontban
- ajánlott, önköltséges védőoltások: felzárkóztató oltás vagy életkori, életviteli, egészségügyi rizikó állapot esetén

Alulírott (szülő, gondviselő) aláírásommal igazolom,
 hogy részletes tájékoztatást kaptam gyermekem orvosától a kötelező, az önkéntes és
 az ajánlott csecsemő- és gyermekkori oltásokról.
 Az oltási naptárt átvettem.

Dátum:

.....
 aláírás



- 1. BCG (Bacille Calmette-Guérin; tbc elleni védőoltás)**
Az újszülötteleket a szülészeti intézményben oltják BCG oltóanyaggal, ami a súlyos kisdedkori tuberkulózis ellen ad védelmet.
- 2. DTPa-IPV-Hib (diphtheria, tetanus, pertussis, polio és Haemophilus influenzae B típusa elleni védőoltás)**
Csecsemőkortól egy kombinált oltás a torokgyík, a tetanusz, a szamárköhögés, a járványos gyermekbénulás, és a Haemophilus influenzae b baktérium ellen, mely gennyes agyhártyagyulladást, véráramfertőzést, gégefőgyulladást, tüdőgyulladást, középfülgyulladást, arcüreggyulladást okoz.
A csecsemőkortban háromszor beadott oltást 18 hónaposan szükséges ismételni, majd 6 évesen már Hib komponens nélkül. VI. osztályban a diphtheria, a tetanus és a pertussis emlékeztető, kombinált oltást kapják meg a serdülők.
- 3. PCV13 (pneumococcus elleni védőoltás)**
Pneumococcus baktérium gennyes agyhártyagyulladást, véráramfertőzést, tüdőgyulladást, középfülgyulladást okoz.
Az oltással csecsemő és felnőtt korban a leggyakoribb 13 típus okozta fertőzés okozta megbetegedés akadályozható meg. Az oltás csecsemő-korban 3 adagból áll.
- 4. MMR (morbilli, mumpsz, rubeola elleni védőoltás)**
A kanyaró, a mumpsz (járványos fültőmirigy gyulladás) és a rubeola (rózsahimlő) elleni élő, gyengített vírust tartalmazó oltást 15 hónaposan kapják a csecsemők és a VI. osztályos korban ismétlik meg.
Akár 9 hónapos kortól javasolt külföldi utazás és/vagy járványügyi helyzet megváltozása esetén.
- 5. Varicella (bárányhimlő elleni védőoltás)**
Kiütéses vírusfertőzés, ami legtöbbször ártalmatlan, de súlyos szövődményekkel is járhat, bőrfertőzést, vérmérgezést, tüdő-, szívizom-, és májgyulladást okozhat.
Az oltás két adagból áll. 9 hónapos kortól adható. A beteggel való érintkezés után 72 órán belül van esély a fertőzés kivédésére. 2 oltásból álló, 13 és 16 hónapos korban adott kötelező védőoltás.
- 6. HepatitisB (HepatitisB vírus elleni védőoltás)**
Vírus okozta fertőző májgyulladás sárgasággal, általános tünetekkel, gyengeséggel jár. Szexuális úton, vérrrel és testnedvekkel terjed. Krónikus gyulladásához, májzsugorhoz, májrákhoz vezető fertőzés.
- 7. MenC / MenACWY / MenB (a meningococcus A, B, C, W és Y csoportja elleni védőoltások)**
Meningococcus baktérium típusai cseppfertőzéssel terjedő, nehezen felismerhető, rendkívül gyors lefolyású, ezért magas halálozással járó fertőzést okozhatnak, mely gennyes agyhártyagyulladásként és/vagy véráramfertőzésként jelennek meg. Végtetes következményekkel vagy tartós szövődményekkel járhatnak. A meningococcus okozta megbetegedés megelőzésének egyetlen hatékony módja a védőoltás. Életkori rizikó alapján 2 hónapos kortól 25 éves korig javasolt a folyamatos védettséget fenntartani.
A meningococcus C és B ellen egykomponensű, az A,C,W,Y ellen 4 komponensű oltóanyagok vannak forgalomban. Az oltási adagok száma az oltóanyagtól és a gyermek életkorától függően változik.
- 8. HPV (Humán papillóma vírus elleni védőoltás)**
Humán papillóma vírus, az emberi hámsejten szaporodik, nemi úton terjedő, jó- és rosszindulatú daganatok kialakulásáért felelős. Fiúknak és lányoknak egyaránt javasolt. 2 és 9 valensű oltóanyagok vannak forgalomban. A 9 komponensű oltóanyagok a rosszindulatú daganatos elfajulás mellett, a jóindulatú szemölcsös elváltozás kialakulása ellen is védenek. Az oltóanyagok 9 éves kortól adhatóak, életkortól függően 2, ill. 3 adagból állnak.
- 9. Rotavírus (Rotavírus elleni védőoltás)**
A gyomor-bélrendszer gyulladásával járó vírusfertőzés. Súlyos szövődménye a kiszáradás, ami kórházi kezeléshez vezethet. Két, illetve három dózisu, szájon át adható, élő gyengített vírust tartalmazó oltóanyaggal előzhető meg. 6 hetes kortól javasolt alkalmazni. A két adagos oltásnál a vakcinációt lehetőleg 16 hetes kor előtt kell elvégezni, de 24 hetes korig mindenképp be kell fejezni. A három adagos oltásnál az első dózist legkésőbb 12 hetes korig kell beadni, a 3.adagot legkésőbb a 32. héten lehet alkalmazni.
- 10. Kullancsencephalitis elleni védőoltás**
Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás megelőzésére. A kullancsencephalitisszel szemben a védőoltás alkalmazása jelenti a leghatékonyabb védelmet. A folyamatos védelem fenntartásának érdekében rendszeres emlékeztető oltás szükséges.
Az oltás Lyme betegség ellen nem ad védelmet.
- 11. Influenza (Influenza elleni védőoltás)**
Cseppfertőzéssel terjedő vírusfertőzés.
A teljes előlt vírus burok oltóanyag 3 éves kortól, vírus burok – alegység oltóanyagok 6 hónapos kortól adhatóak. Utóbbinál az első oltás alkalmával, 9 évesnél fiatalabb gyermekeknek 2 adagra van szükség, minimum 4 hét különbséggel. Az oltások évente ismételendők, mert a vírus szerkezete évről évre változhat és új vírus is megjelenhet. 6 hónapos kor alattiakataz oltott környezetet védi.
- 12. HepatitisA vírus elleni védőoltás**
A HepatitisA vírus okozta fertőző májgyulladás, széklettel, ivóvízzel, ritkán vérékszítménnyel terjed. 1 éves kor felett javasolható.

Összeállította: Dr. Kulcsár Andrea, Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Védőoltási Szakrendelő vezetője

Felhasznált irodalom:

Védőoltási Módszertani Levél-2019. https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany_modszertani_levelek. Utolsó megtekintés: 2019. május 29.

European Medicines Agency honlap www.emea.europa.eu

OGYÉI honlap: www.ogyei.gov.hu

A táblázat a hazai, illetve európai törzskönyvvvel rendelkező oltóanyagokat tartalmazza.



Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
MOM Park „A” épület
Tel: 488-3700 www.pfizer.hu

Az anyag lezárásának dátuma: 2019. július 10.
OGYÉI engedélyszám: OGYÉI/xxxx
PP-FSM-HUN-0024



NeisVac-C



Nimenrix™



Trumenba®



Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyorsazonosítását. Ehhez Ön is hozzájárulhat a tudására jutó bármilyen mellékhatás bejelentésével.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az orvosnál marad!

